OBESIMED® FORTE

Medical device CE 0086

Pour un surpoids de 10 kilos ou plus

Pour le **traitement** de **l'obésité**
Réduit la faim et évite de **manger trop**
Pour une **perte de poids substantielle**

Conseil général : Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser Obesimed® Forte, même si vous avez déjà eu recours auparavant à ce produit, car en effet, il peut avoir subi des modifications à la suite de nouvelles recherches et des résultats en découlant. Ce dispositif peut être obtenu sans prescription médicale. Cependant, vous devez utiliser Obesimed® Forte avec le plus grand soin pour parvenir à un résultat optimal. Veuillez conserver le mode d'emploi, il se peut que vous deviez le relire plus tard.

Pourquoi utiliser Obesimed® Forte ? Obesimed® Forte est un dispositif médical utilisé pour perdre du poids. Il est destiné aux adultes de 18 ans ou plus qui présentent une surcharge pondérale de plus de 10 kilos ou un Indice de Masse Corporelle (IMC) de 28 ou plus. Pour un bon résultat, il est recommandé d'utiliser Obesimed® Forte en combinaison avec un régime appauvri en calories.

L'IMC est une méthode qui vous permet de déterminer si votre poids est sain ou trop élevé par rapport à votre taille. Le tableau ci-dessous vous permet d'établir si vous êtes en surpoids.

Recherchez votre taille dans le tableau.

Si vous pesez moins que le poids qui figure à côté de votre taille, vous ne devez pas utiliser Obesimed® Forte.

Taille	Poids (kg)
1,50 m	63 kg
1,55 m	67,25 kg
1,60 m	71,75 kg
1,65 m	76,25 kg
1,70 m	81 kg
1,75 m	85,75 kg
1,80 m	90,75 kg
1,85 m	95,75 kg
1,90 m	101 kg

L'IMC ne peut être utilisé que pour les adultes et n'est pas applicable dans tous les cas. Il ne peut pas être utilisé chez les enfants en pleine croissance, chez les femmes enceintes et chez les sportifs de haut niveau.

Fonctionnement d'Obesimed® Forte : Obesimed® Forte fournit une approche différente de la perte de poids par l'utilisation d'une combinaison de polysaccharides visqueux naturels et très purs qui renforcent l'un l'autre leur action. Obesimed® Forte absorbe de 30 minutes à une heure des centaines de fois son poids en eau. Dès que la gélule est dissoute, elle se dilate dans l'estomac et une matrice de gel stable hautement visqueuse se forme. Celle-ci crée une sensation de satiété permettant de réduire la portion d'aliments à ingérer et ainsi de suivre beaucoup plus facilement un régime. Après avoir consommé le repas, la matrice de gel se mélange aux aliments. Ainsi, non seulement la faim est repoussée, mais la digestion est aussi ralentie. Obesimed® Forte assure une réduction de la faim par une saturation de l'estomac et par la promotion d'un équilibre glycémique salutaire.

Dosage et utilisation : 1 à 2 gélules 3 x par jour, à prendre 1 heure avant chaque repas avec au moins 1 verre d'eau. Absorber la gélule tout entière.

Le dosage efficace peut varier d'une personne à l'autre et peut aller de 1 à 2 gélules par dose jusqu'au dosage maximal de 6 gélules trois fois par jour.

Le dosage peut être augmenté tous les 3 jours de 1 gélule par repas, jusqu'à ce que la sensation de faim diminue clairement et que le besoin de grignoter entre les repas disparaisse. Ne pas dépasser le dosage maximal.

Obesimed® Forte ne doit pas être utilisé pendant plus de 30 jours en 1 période de traitement. Après 4 jours, le traitement peut être repris.

Ce produit ne convient pas aux enfants.

Composition : Le produit est basé sur des ingrédients végétaux : Omtec19®, Amylum Solani, OmtecX®, Hypromellose (E464), Oleum Helianthus, Dioxyde de titane (E171).
Le produit convient aux végétariens.

Allergènes : Le produit ne contient aucun allergène.

Utilisation pendant la grossesse et/ou l'allaitement : Il n'est pas recommandé de maigrir pendant la grossesse ou l'allaitement, car d'éventuelles substances nuisibles provenant du tissu graisseux peuvent atteindre l'enfant. Par conséquent, l'utilisation d'Obesimed® Forte est déconseillée.

Utilisation en combinaison avec des médicaments : Obesimed® Forte réduit le taux de glycémie. Si vous souffrez de diabète, il est important de bien contrôler votre taux de glycémie. Consultez dans ce cas votre médecin, car il se peut que votre traitement contre le diabète doive être adapté.

L'utilisation d'Obesimed® Forte en combinaison avec d'autres compléments alimentaires ayant un effet hypoglycémique similaire est donc déconseillée sans avoir préalablement demandé conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Obesimed® Forte ralentit le rythme avec lequel les aliments sont absorbés et en théorie, il peut en être de même pour les médicaments. Les médicaments à prendre oralement doivent être pris 1 heure avant ou 4 heures après l'utilisation d'Obesimed® Forte. Consultez votre médecin ou votre pharmacien lorsque vous prenez des médicaments avant de commencer à utiliser Obesimed® Forte.

Multivitamines et Obesimed® Forte : Pendant la perte de poids et l'utilisation d'Obesimed® Forte, il est recommandé de prendre chaque jour un complexe de vitamines et de minéraux. Obesimed® Forte peut en effet réduire l'assimilation de certaines vitamines et certains minéraux dans le corps. Prenez ce complexe de vitamines et minéraux de préférence avant d'aller vous coucher, pour être certain que les vitamines et minéraux seront assimilés.

Avertissements :

- Obesimed® Forte ne doit pas être utilisé en cas de :
  - hypersensibilité à un ou plusieurs composants,
  - troubles gastro-intestinaux,
  - sténose de l'œsophage ou anomalies de l'intestin déjà existantes,
  - grossesse ou allaitement.
- En cas de doute quant à savoir si vous pouvez utiliser Obesimed® Forte et/ou l'utiliser en combinaison avec un médicament, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.
- Attention ! Ne pas ouvrir la gélule avant de l'ingérer.
- Garder hors de portée des jeunes enfants.

Effets indésirables éventuels : Obesimed® Forte est bien supporté, mais il peut provoquer certains effets indésirables, chez certaines personnes seulement. Au début, de légers troubles gastriques et intestinaux peuvent se produire, comme des selles molles, une légère diarrhée, des renvois et des gaz ou de la constipation. Généralement, ces effets indésirables disparaissent après quelques jours. Pour éviter des effets indésirables, il est possible de commencer avec un faible dosage (1 gélule par repas), après quoi vous pouvez progressivement augmenter le dosage, au fur et à mesure que le corps s'est habitué au dosage. Lorsqu'un des effets indésirables est important ou lorsque un effet indésirable qui ne figure pas dans le mode d'emploi survient, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

Poids net total : 42 gélules 39 grammes, 920 mg par gélule

Mode de conservation : Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un endroit sec et sombre, dans l'emballage d'origine et hors de portée des enfants.

Dispositif médical : La fabrication des gélules répond à des exigences de qualité très strictes conformément à la norme ISO 13485: 2003. Obesimed® Forte est un dispositif médical de classe IIa conformément à la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE, modifié par MDD 2007/47/CEE.

Date limite d'utilisation : L'utilisation d'Obesimed® Forte après la date indiquée sur l'emballage après la mention <<à consommer avant le>> est déconseillée.

Date de la dernière révision du mode d'emploi: octobre 2011 IFU OB 10-11

PK Benelux BV,
Vluchtoord 17, 5406 XP Uden NL

Distribution CH :
F. Uhlmann - Eyraud SA - 1217 Meyrin - Suisse

CE 0086